



ワクチン		種類	乳児期									幼児期								学童期／思春期							
			生 直 後	6 週	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9-11 か 月	12-15 か 月	16-17 か 月	18-23 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳以上			
インフルエンザ菌b型（ヒブ）		不活化			①	②	③					④（注1）															
肺炎球菌（PCV13）		不活化			①	②	③					④	（注2）														
B型肝炎	ユニバーサル	不活化			①	②			③				（注3）														
	母子感染予防		①	②					③																		
ロタウイルス	1価	生			①	②			（注4）																		
	5価				①	②	③			（注5）																	
4種混合（DPT-IPV）		不活化				①	②	③				④（注6）		（7.5歳まで）													
3種混合（DPT）		不活化				①	②	③				④（注6）		（7.5歳まで）													
														⑤ （注7）			⑥11-12歳 （注8）										
2種混合（DT）		不活化															11歳 ①		12歳								
ポリオ（IPV）		不活化				①	②	③				④（注6）		（7.5歳まで）													
															⑤ （注9）												
BCG		生					①																				
麻疹・風疹混合（MR）		生									①					② （注10）											
水痘		生									①		②	（注11）													
おたふくかぜ		生									①					② （注12）											
日本脳炎		不活化												① ②	③	（7.5歳まで）		④9-12歳									
インフルエンザ		不活化					毎年（10、11月などに）①②											13歳より①									
ヒトパピローマウイルス（HPV）		不活化																	（注13）	小6	中1 ①②③（注14）		中2～ 高1				

任意接種の推奨期間添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間健康保険での接種時期

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 標準的接種期間 ・ 日本小児科学会の考え方 ・ 注意事項


2020年1月版 日本小児科学会



定期接種



任意接種



健康保険での接種

ワクチン	種類	標準的接種年齢と接種期間	日本小児科学会の考え方	注意事項
インフルエンザ菌b型 (ヒブ)	不活化	①-②-③はそれぞれ27-56日(4-8週)あける ③-④は7-13か月あける	(注1) ④は12か月から接種することで適切な免疫が早期に得られる。1歳をこえたら接種する	・定期接種として、①-②-③の間はそれぞれ27日以上、③-④の間は7か月以上あける ・7か月-11か月で初回接種：①、②の後は7か月以上あけて③、1歳-4歳で初回接種：①のみ ・リスクのある患者では、5歳以上でも接種可能
肺炎球菌(PCV13)	不活化	①-②-③はそれぞれ27日(4週)以上あける ③-④は60日(2か月)以上あけて、かつ、1歳から1歳3か月で接種	(注2) 定期接種で定められた回数のPCV7接種を終了した6歳未満の児は、最後の接種から8週間以上あけてPCV13の追加接種を1回行う(ただし任意接種)	・7か月-11か月で初回接種：①、②の接種後60日以上あけて1歳以降に③ ・1歳-23か月で初回接種：①、②を60日以上あける、2歳-4歳で初回接種：①のみ (注2) PCV7の接種が完了していないものは残りの接種をPCV13で実施する
B型肝炎 ユニバーサル ワクチン	不活化	① 生後2か月 ② 生後3か月 ③ 生後7-8か月 ①-②は27日(4週)以上、 ①-③は139日(20週)以上あける	家族内に母親以外のB型肝炎キャリアがいる場合は、生後2か月まで待たず、早期接種が望ましい	(注3) 乳児期に接種していない児の水平感染予防のための接種、接種間隔は、ユニバーサルワクチンに準ずる
B型肝炎 母子感染予防のための ワクチン		① 生直後 ② 1か月 ③ 6か月		・母親がHBs抗原陽性の場合、出生時、ワクチンと同時にHB免疫グロブリンを投与するが、ワクチンの接種費用は健康保険でカバーされる ・詳細は日本小児科学会ホームページ「B型肝炎ウイルス母子感染予防のための新しい指針」を参照 http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=141

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 標準的接種期間 ・ 日本小児科学会の考え方 ・ 注意事項

2020年1月版 日本小児科学会



ワクチン	種類	標準的接種年齢と接種期間	日本小児科学会の考え方	注意事項
ロタウイルス	生	・ 生後6週から接種可能、①は8週-15週未満を推奨する ・ 1価ワクチン（ロタリックス®）：①-②は、4週以上あける（計2回） ・ 5価ワクチン（ロタテック®）：①-②-③は、4週以上あける（計3回）	生後15週以降は、初回接種後7日以内の腸重積症の発症リスクが増大するので、原則として初回接種を推奨しない。 ただし、長期入院等の何らかの医学的理由により接種機会を得られなかった乳児については、上記の情報について保護者に丁寧に説明を行い、同意を得てから、生後15週以降の初回接種を考慮することが考えられる。また、初回接種については、経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン：ロタリックス®は生後20週0日まで、5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン：ロタテック®は生後24週0日までに初回接種が行われないと、4週間の間隔をあけて2回目（経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン：ロタリックス®）、3回目（5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン：ロタテック®）の接種ができないことに注意が必要である。	（注4）計2回、②は、生後24週0日までに完了すること （注5）計3回、③は、生後32週0日までに完了すること

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 標準的接種期間 ・ 日本小児科学会の考え方 ・ 注意事項

2020年1月版 日本小児科学会



ワクチン	種類	標準的接種年齢と接種期間	日本小児科学会の考え方	注意事項
4種混合（DPT-IPV）	不活化	①-②-③はそれぞれ20-56日（3-8週）あける （注6）③-④は6か月以上あけ、標準的には③終了後12-18か月の間に接種		・ 定期接種として、①-②-③の間はそれぞれ20日以上あける ・ 現時点で、就学前の3種混合ワクチンとポリオワクチンの接種を4種混合ワクチンで代用することは、承認されていない ・ 4種混合ワクチンは4回までの接種に限られ、5回目以降の追加接種については、3種混合ワクチンかポリオワクチンを用いる
3種混合（DPT）	不活化	①-②-③はそれぞれ20-56日（3-8週）あける （注6）③-④は6か月以上あけ、標準的には③終了後12-18か月の間に接種		
3種混合（DPT） 学童期以降の 百日咳予防目的	不活化	⑤ 5歳以上7歳未満、④より6か月以上あける ⑥ 11-12歳に接種	（注7）就学前児の百日咳抗体価が低下していることを受けて、就学前の追加接種を推奨 （注8）百日咳の予防を目的に、2種混合の代わりに3種混合ワクチンを接種してもよい	・ 2013年の小児の年齢別の百日咳の抗体保有状況では、抗PT抗体価 10 EU/mL以上の保有率は、4-7歳で40%未満に低下（IASR 2017; 38: 31-33） ・ 0.5mLを接種（2種混合ワクチンは、0.1mL）
2種混合（DT）	不活化	① 11歳から12歳に達するまで		・ 予防接種法では、11歳以上13歳未満、0.1mLを接種

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 標準的接種期間 ・ 日本小児科学会の考え方 ・ 注意事項

2020年1月版 日本小児科学会



ワクチン	種類	標準的接種年齢と接種期間	日本小児科学会の考え方	注意事項
ポリオ (IPV)	不活化	①-②-③はそれぞれ20-56日 (3-8週) あける (注6) ③-④は6か月以上あけ、標準的には③終了後12-18か月の間に接種		・ 2012年8月31日以前にポリオ生ワクチン、または、ポリオ不活化ワクチンを接種し、接種が完了していない児への接種スケジュールは、厚生労働省ホームページを参照 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/polio/dl/leaflet_120601.pdf
ポリオ (IPV) 学童期以降の ポリオ予防目的		⑤ 5歳以上7歳未満	(注9) ポリオに対する抗体価が減衰する前に就学前の接種を推奨	
BCG	生	・ 12か月未満に接種 ・ 標準的には5-8か月未満に接種	結核の発生頻度の高い地域では、早期の接種が必要である	
麻疹・風疹混合 (MR)	生	① 1歳以上2歳未満 ② 5歳以上7歳未満 (注10) 小学校入学前の1年間		・ 麻疹曝露後の発症予防では、麻しんワクチンを生後6か月以降で接種可能、ただし、その場合、その接種は接種回数には数えず、①、②は規定通り接種する
水痘	生	① 生後12-15か月 ② 1回目から6-12か月あける	(注11) 水痘未罹患で接種していない児に対して、積極的に2回接種を行う必要がある	・ 定期接種として、①-②の間は3か月以上あける ・ 13歳以上では、①-②の間を4週間以上あける
おたふくかぜ	生	① 1歳以上	(注12) 予防効果を確実にするために、2回接種が必要である ①は1歳を過ぎたら早期に接種、②はMRと同時期 (5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間) での接種を推奨する	

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 標準的接種期間 ・ 日本小児科学会の考え方 ・ 注意事項

2020年1月版 日本小児科学会



ワクチン	種類	標準的接種年齢と接種期間	日本小児科学会の考え方	注意事項
日本脳炎	不活化	①・② 3歳、①-②は6-28日（1-4週）あける ③ 4歳、①から1年あける ④ 9歳	日本脳炎流行地域に渡航・滞在する小児、最近日本脳炎患者が発生した地域・ブタの日本脳炎抗体保有率が高い地域に居住する小児に対しては、生後6か月から日本脳炎ワクチンの接種開始を推奨する（日本小児科学会ホームページ「日本脳炎リスクの高い者に対する生後6か月からの日本脳炎ワクチンの推奨について」を参照） http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=207	・ 1回接種量：6か月-3歳未満：0.25mL；3歳以上：0.5mL ・ 定期接種では、生後6か月から生後90か月（7歳6か月）未満（第1期）、9歳以上13歳未満（第2期）が対象、①-②は6日以上、③は②より6か月以上の間隔をあける ・ 2007年4月2日から2009年10月1日生まれの児に対しては、生後6か月から90か月（7歳6か月）未満または、9歳から13歳未満の間に1期（①、②、③）のうち、未接種回数を定期として接種が可能である。2005年5月からの積極的勧奨の差し控えを受けて、1995年4月2日から2007年4月1日生まれの児は、20歳未満まで定期接種の対象、具体的な接種については厚生労働省ホームページを参照 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/annai.html
インフルエンザ	不活化	①-②は4週（2-4週）あける		・ 13歳未満：2回、13歳以上：1回または2回 ・ 1回接種量：6か月-3歳未満：0.25mL； 3歳以上：0.5mL
ヒトパピローマウイルス（HPV）	不活化	中学1年生女子 ・ 2価ワクチン（サーバリックス®） ①-②は1か月、①-③は6か月あける ・ 4価ワクチン（ガーダシル®） ①-②は2か月、①-③は6か月あける	2013年6月より、積極的接種推奨が中止されているが、HPVワクチンの有害事象の実態把握と解析、接種後に生じた症状に対する報告体制と診療・相談体制の確立、健康被害を受けた被接種者に対する救済などの対策が講じられたことを受けて、積極的接種を推奨する（予防接種専門推進協議会ホームページを参照） http://vaccine-kyogikai.umin.jp/pdf/20160418_HPV-vaccine-opinion.pdf	・ 接種方法は、筋肉内注射（上腕三角筋部） ・ 予防接種法では、12歳-16歳（小学校6年生から高校1年生相当）女子 （注13）2価ワクチンは10歳以上、4価ワクチンは、9歳以上から接種可能 （注14）標準的な接種ができなかった場合、定期接種として以下の間隔で接種できる（接種間隔が2つのワクチンで異なることに注意） ・ 2価ワクチン：①-②の間は1か月以上、①-③の間は5か月以上、かつ②-③の間は2か月半以上あける ・ 4価ワクチン：①-②の間は1か月以上、②-③の間は3か月以上あける

予防接種チェック表

氏名：生年月日：年 月 日

定期接種

任意接種

ワクチン	種類	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回
Hib (インフルエンザ菌b型)	不活化	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日		
肺炎球菌 (PCV13)	不活化	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日 スケジュールの(注2)参照	
B型肝炎	不活化	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日			
ロタウイルス	生	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日 1価ワクチン(ロタリックス®)は2回	接種日 年 月 日 5価ワクチン(ロタテック®)は3回			
4種混合、または 3種混合とポリオ	不活化	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日		
3種混合 (学童期以降の百日咳予防)	不活化					接種日 年 月 日	接種日 年 月 日
2種混合	不活化					接種日 年 月 日	
ポリオ (学童期以降のポリオ予防)	不活化					接種日 年 月 日	
BCG	生	接種日 年 月 日					
麻疹・風疹 (MR)	生	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日				
水痘	生	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日				
おたふくかぜ	生	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日				
日本脳炎	不活化	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日		
インフルエンザ	不活化	(毎年接種が推奨されるので、2枚目を参照)					
ヒトパピローマ ウイルス (HPV)	不活化	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日	接種日 年 月 日			



インフルエンザ予防接種チェック表

氏名： _____ 生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

年齢	第1回		第2回		年齢	第1回		第2回	
6か月～ 11か月	☐	接種日 年 月 日	☐	接種日 年 月 日	8歳	☐	接種日 年 月 日	☐	接種日 年 月 日
1歳	☐	接種日 年 月 日	☐	接種日 年 月 日	9歳	☐	接種日 年 月 日	☐	接種日 年 月 日
2歳	☐	接種日 年 月 日	☐	接種日 年 月 日	10歳	☐	接種日 年 月 日	☐	接種日 年 月 日
3歳	☐	接種日 年 月 日	☐	接種日 年 月 日	11歳	☐	接種日 年 月 日	☐	接種日 年 月 日
4歳	☐	接種日 年 月 日	☐	接種日 年 月 日	12歳	☐	接種日 年 月 日	☐	接種日 年 月 日
5歳	☐	接種日 年 月 日	☐	接種日 年 月 日	13歳	☐	接種日 年 月 日		
6歳	☐	接種日 年 月 日	☐	接種日 年 月 日	14歳	☐	接種日 年 月 日		
7歳	☐	接種日 年 月 日	☐	接種日 年 月 日	15歳	☐	接種日 年 月 日		

